

*Медико-социальные аспекты  
СДВГ у детей школьного возраста*

*Студеникин В.М.*

*2006 г.*

**СДВГ: основные составляющие  
симптомокомплекса**

- ◆ **ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ**
- ◆ **ГИПЕРАКТИВНОСТЬ**
- ◆ **СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
ОБУЧЕНИЯ**
- ◆ **ДРУГИЕ  
НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ  
НАРУШЕНИЯ**

# Методы исследований СДВГ

- Неврологические
- Психиатрические
- Психологические
  - Генетические
- Нейрофизиологические
- Нейровизуализационные
  - Нейрохимические
  - Другие

# Основные типы СДВГ (на основе поведенческих характеристик)

DSM-IV, МКБ-10

- СДВГ – преимущественно гиперактивный тип
- СДВГ – тип с преимущественным дефицитом внимания
  - СДВГ – комбинированный тип
- Классическая триада симптомов при СДВГ:
  - Гиперактивность
  - Импульсивность
  - Нарушения внимания

# Дефиниции триады симптомов

## **ГИПЕРАКТИВНОСТЬ:**

*Неспособность сосредоточиться на предъявляемом задании, спокойно сидеть на месте – в сочетании с видимым присутствием двигательной активности (т.е. двигательным беспокойством)*

## **ИМПУЛЬСИВНОСТЬ:**

*Трудности в определении и выделении приоритетов, а также в подавлении немедленных реакций на факторы окружения, конкурирующие в привлечении внимания детей*

## **НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ:**

*Неспособность в полной мере подавлять поведенческое реагирование на менее значимые раздражители в различных условиях – семейных, учебных, других социально обусловленных ситуациях*

# Формы СДВГ: «чистые» и сочетанные

**Чистые формы СДВГ (simplex)**  
**Сочетанные (комбинированные) формы СДВГ (complex):**

*Последние сопровождаются дополнительными нарушениями:*

- **Обучения** (дислексия, дискалькулия, дисграфия/дисортография и т.д.)
- **Моторики** (нарушения моторного умения)
- **Общения** (коммуникативные): нарушения экспрессивной и рецептивно-экспрессивной речи, фонации, логоневрозы и т.д.)
- **+ Различные коморбидные состояния**

# Коморбидные состояния при СДВГ

## Нарушения эмоционального контроля:

- 1) Аффективные, 2) тревожность, 3) панические, 4) обсессивно-компульсивные

## Нарушения двигательного контроля:

- 1) Тикозные, 2) пароксизмальные, 3) нарушения сна

## Нарушения комфорта:

- 1) Головные боли, 2) недержание мочи, 3) синдром раздраженного кишечника

## Нарушения, связанные с использованием интоксикантов:

- 1) Токсические ингалянты, 2) табак, 3) алкоголь, 4) наркотические вещества

## Нарушения с разрушительным поведением

- 1) Оппозиционно-вызывающее поведение, 2) кондуктивные нарушения, 3) антисоциальное поведение

# Лечение СДВГ: мировая практика

- ❖ **Стимуляторы ЦНС**  
(метилфенидат, декстроамфетамин)
- ❖ **Трициклические антидепрессанты**  
(имипрамин, дезипрамин)
- ❖ **Новые антидепрессанты**  
(бупропион и др.)
- ❖ **Анксиолитики**  
(буспирон, гидроксизин)
- ❖ **Другие препараты** (ноотропы, мультивитамины, АЭП и др.)
- ❖ **Немедикаментозные методы терапии**